

HIPRALONA ENRO-I

انروفلوکساسین تزریقی



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRALONA ENRO-I

انروفلوکساسین تزریقی

گروه دارویی

آنتی بیوتیک - محلول تزریقی

ترکیب دارویی

۵۰ میلی گرم انروفلوکساسین در هر میلی لیتر

خصوصیات دارویی

انروفلوکساسین دارویی از نسل سوم فلوروکینولون‌ها می باشد که در سالیان اخیر مصرف آن در دامپزشکی برای درمان بیماری‌ها گسترش زیادی پیدا کرده است. اساس عملکرد آن ممانعت از عملکرد و فعالیت آنزیم DNA ژیراز در باکتری‌ها بوده و به شکل موثری در مقابل طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا موثر است. میزان حداقل غلظت موثر این دارو در برابر اکثر میکروارگانیسم‌های بیماریزا (که در دامپزشکی بیشتر مطرح هستند) نظیر E.Coli، سالمونلا، پاستورلا، استافیلوکوک، استرپتوکوک و مایکوپلاسماها، پایین است و لذا بدلیل این ویژگی و فارماکوکینتیک خاص دارو، سطح موثری از غلظت دارو به سرعت ایجاد می شود. به بیان دیگر، بعد از تجویز، دارو سریعاً جذب شده و در مدت زمان کوتاهی غلظت آن در سرم، مایعات بافتی بافت پستان و بافت عضلانی و متعاقب آن در کبد، ریه ها، کلیه‌ها و قلب به حد درمانی مورد انتظار می رسد.

موارد مصرف

گوساله: در درمان پاستورلوزیس، کلی باسیلوزیس و سالمونلوزیس.

گاو: در درمان بیماری‌های تنفسی و روده ای (پاستورلوزیس، مایکوپلاسموزیس، کلی باسیلوزیس، کلی سپتیمی سمی و عفونتهای باکتریایی ثانویه)، ورم پستان ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس.

انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که بر روی تمام باکتریهای گرم منفی نظیر سالمونلا، E.Coli، پزودوموناس آئروژینوزا و موراکسلا بویس موثر است. همچنین بر روی باکتریهای گرم مثبت نظیر استافیلوکوک، کلستریدیوم، اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه، کورینه باکتریوم پیوژنز، لیستریا مونوسیتوژنز و مایکوپلاسماهای طیور نیز موثر است.

با توجه به خصوصیات فارماکولوژی و طیف وسیع و چگونگی عملکرد دارو، انروفلوکساسین به عنوان آنتی بیوتیک اختصاصی برای درمان بیشتر عفونت‌هایی که به وسیله مایکوپلاسماها و باکتریها در حیوانات ایجاد می شوند، به کار می رود.

روش مصرف

گوساله: داخل عضلانی

گاو: داخل عضلانی، زیر جلدی و داخل وریدی (بیشتر از ۱۰ میلی لیتر در یک محل تزریق، بصورت عضلانی و یا زیر جلدی تجویز نشود).

میزان مصرف

۰/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز و در موارد عفونت شدید تنفسی و یا سالمونلوزیس، ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ تا ۵ روز.

مدت زمان منع مصرف

برای گوشت: ۱۲ روز

شرایط نگهداری

در جای خنک و به دور از نور نگهداری گردد.

بسته بندی

بطری ۱۰۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: شرکت پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

