

SELECTAN

سلکتان
محلول تزریقی فلور فنیکل



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



SELECTAN

محلول تزریقی فلورفنیکل

گروه دارویی

آنتی بیوتیک - محلول تزریقی

تجویز دارو به گاوهای شیرده که شیرشان به مصرف انسان می رسد توصیه نمی شود.

ترکیب دارویی

هر میلی لیتر حاوی

فلورفنیکل ۳۰۰ mg

موارد احتیاط

لازم است فرد تجویز کننده، در زمان تزریق دارو به دام مراقب تزریق تصادفی دارو به خود باشد، همچنین از تماس دارو با پوست و چشم‌ها خودداری گردد. در صورت تماس بلافاصله آن ناحیه با آب تمیز شستشو گردد.

افرادی که سابقه حساسیت به فلورفنیکل، پروپیلن گلیکول و یا پلی اتیلن گلیکول دارند، بایستی از تماس با این دارو پرهیز کنند.

تداخل دارویی

تا کنون موردی گزارش نشده است.

اثرات جانبی

در برخی از گاوهای تحت درمان، کاهش موقت مصرف غذا (آنورکسی) و کاهش قوام مدفوع مشاهده می شود، که این علائم به سرعت بعد از پایان درمان بهبود می یابد. در محل تزریق ممکن است التهاب گذرا ایجاد شود که تا دو هفته ادامه داشته باشد.

شرایط نگهداری

در جای خنک و تاریک نگهداری شود.

حداکثر ۲۸ روز بعد از باز کردن درب دارو استفاده گردد.

بسته بندی

بطری های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت واردکننده: شرکت سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر



مکانیسم اثر

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف با توانایی اثر بر علیه میکروارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت می باشد. این دارو با اتصال به واحد 50 S ریبوزومی مانع سنتز پروتئین در باکتری ها شده و اثر ضد میکروبی خود را اعمال می کند. بررسی های آزمایشگاهی نشان می دهد که این آنتی بیوتیک بر علیه عوامل ایجاد کننده پنومونی در گاو و گوساله ها مثل مانهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتی سیدا و هموفیلوس سمنوس خاصیت باکتری کشی دارد.

موارد مصرف

گاو: این آنتی بیوتیک در درمان عفونت های تنفسی و تب حمل و نقل ایجاد شده توسط مانهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتی سیدا، هموفیلوس سمنوس و تروپرلا پایوژنز موثر می باشد.

روش و میزان مصرف

۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام (۱ سی سی به ازای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن) بصورت داخل عضلانی (ترجیحاً عضله گردن) دو نوبت تزریق به فاصله ۴۸ ساعت.

تزریق حجم بالای دارو (بیش از ۱۰ سی سی) در هر نقطه خودداری نمائید.

مدت زمان منع مصرف

گوشت: ۳۰ روز

موارد منع مصرف

از تزریق دارو به صورت وریدی اجتناب گردد. همچنین از مخلوط کردن این ترکیب با دیگر ترکیبات دارویی پرهیز شود.