

# BRONIPRA® 1

Live vaccine, infectious bronchitis H120 strain

واکسن زنده برونشیت عفونی سویه H120



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health



## توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴  
[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)



# BRONIPRA 1

## واکسن زنده برونشیت عفونی سویه H120

### ترکیب

هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی، سویه H120 به میزان  $10^{5.4}$  EID<sub>50</sub> -  $10^3$  می باشد.

### موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری برونشیت عفونی در گله‌های گوشتی، تخمگذار و مادر

### روش مصرف

قطره چشمی - بینی، آشامیدنی و اسپری

### روش قطره بینی-چشمی

پس از تزریق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید و محلول تولیدی را با مابقی حلال مخلوط کنید. یک قطره واکسن (هر پرنده ۰/۰۳ میلی لیتر) را در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز) بچکانید.

### روش آشامیدنی

ابتدا از میزان اندکی آب جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه استفاده شود، سپس ویال واکسن را در زیر آب باز نموده بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در ظرف حاوی میزان مناسب آب جهت مصرف ۱ الی ۲ ساعت توسط طیور حل نمایید. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد. تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده نمایید.

### روش اسپری

جهت انجام این روش در ابتدا می بایست دستگاه اسپری را به لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. همیشه ویال واکسن در زیر آب باز گردد. از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نمایید. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد و تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده شود. برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی (سنین بالاتر) می توان از اسپری با قطرات ریز طبق توصیه کارخانه سازنده دستگاه اسپری استفاده نمود. هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظ و عینک استفاده گردد.

### مقدار مصرف

یک دز برای هر پرنده (گوشتی، تخمگذار و مادر). هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد. در مناطقی که بیماری برونشیت بومی می باشد، می توان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود. از تجویز واکسن کمتر از دز (مقدار) توصیه شده جدا خودداری شود. هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید.

### دوره منع مصرف

ندارد.

### شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

### بسته بندی

ویال‌های ۲۵۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

