

HIPRABOVIS 3

Protect the future of the herd by vaccinating calves with broad spectrum Hiprabovis

واکسن کشته سه گانه بر علیه اسهال ویروسی گاو (BVD)،
رینوتراکئیت عفونی گاو (IBR) و پارا (انفولانزا) ۳ (PI3)



The Reference
in Prevention
for Animal Health

محافظت موثر جنین در برابر BVD و IBR



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRABOVIS 3

واکسن کشته سه گانه بر علیه اسهال ویروسی گاو (BVD)، رینوتراکئیت عفونی گاو (IBR) و پارا (انفولانزا) ۳ (PI3)

ترکیب

ویروس غیر فعال IBR، BVD و PI3 همراه با ماده یاور (adjuvant) هیپرابویس ۳ واکسن سه گانه که (بعد از تجویز) ایمنی فعال بر علیه ویروسهای IBR، BVD و PI3 ایجاد کرده و از سندرم تنفسی گاو و مشکلات تولید مثلی ناشی از ویروسهای BVD و IBR از جمله سقط، ناباروری، تولد گوساله های عفونی پایدار (PI) و ولوواژینیت پوسچولار (IPV) جلوگیری می کند.

موارد مصرف

گاو بالغ (گاوها و تلیسه ها): جلوگیری از رینوتراکئیت عفونی گاو، ولوواژینیت پوسچولار عفونی و اسهال ویروسی گاو
گوساله ها: جلوگیری از رینوتراکئیت عفونی گاو، پارا انفولانزا ۳ و اسهال ویروسی گاو

دز

گاو (گوساله، گاو و تلیسه): ۳ میلی لیتر (یک دز) از سن ۴ الی ۶ هفتگی در تمام اوزان و سنین

نحوه تجویز

تزریق داخل عضلانی در ناحیه گردن و یا تزریق زیر جلدی در ناحیه چین های پوستی زیر گردن

برنامه واکسیناسیون

گوساله ها و گاوها: تجویز یک دز واکسن و یادآوری واکسیناسیون ۲۱-۳۰ روز بعد.
تجویز واکسن مجدد بنابر توصیه دامپزشک، هر ۶ تا ۹ ماه یکبار انجام می شود.

ملاحظات قبل از تجویز دارو

واکسیناسیون فقط در گاوهای سالم انجام شود.
تجهیزات استریل برای واکسیناسیون استفاده شود.
واکسیناسیون بلافاصله پس از باز کردن شیشه ها انجام شود.
توصیه می شود واکسیناسیون در دمای معتدل (بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) انجام شود.
شیشه های واکسن قبل از تجویز، خوب تکان داده شود.

عوارض واکسن

مواردی از واکنش های آنافیلاکتیک انفرادی در حیوانات حساس ممکن است مشاهده شود، در این شرایط تجویز اپی نفرین یا داروهای مشابه توصیه می شود.

تجویز واکسن در حین آبستنی و شیرواری

تجویز واکسن در تمام مراحل آبستنی و شیرواری بلامانع است.

دوره پرهیز

دوره پرهیز شیر و گوشت وجود ندارد.

احتیاط های ضروری

در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت با در دست داشتن بروشور واکسن به مراکز درمانی مراجعه شود.

توصیه های ضروری در مورد نگهداری واکسن

واکسن در محل تاریک بین دمای ۲ الی ۸ درجه نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن محافظت شود.

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

