

HIPRACILINA 20

هیپراسیلین ۲۰
اولین سوسپانسیون تزریقی حاوی پنی سیلین، استرپتومایسین،
دگزامتازون و کلرفنامین در ایران



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRACILINA 20

هیپراسیلین ۲۰ (اولین سوسپانسیون تزریقی حاوی پنی سیلین، استریتومایسین، دگزامتازون و کلرفنایم در ایران)

گروه دارویی

سوسپانسیون تزریقی

ترکیب دارویی

هر میلی لیتر از دارو شامل ترکیبات	
بنزیل پنی سیلین پروکائین	۲۰۰۰۰۰ IU
دی هیدرواستریتومایسین	۲۵۰ mg
دگزامتازون سدیم فسفات	۰/۶ mg
کلر فنآمین مالئات	۱۵ mg
اکسیپیان روغنی	۱ ml

خصوصیات دارویی

بنزیل پنی سیلین پروکائین یک آنتی بیوتیک باکتری کش است که در مرحله تکثیر باکتریها وارد عمل می شود و با جلوگیری از اتصال مولکولهای استیل مورامیک اسید باعث تشکیل ناقص دیواره سلولی و افزایش فشار اسمتیک داخل سلولی و نهایتاً نابودی باکتری می گردد. بنزیل پنی سیلین پروکائین به مقدار کم در آب حل می شود و سوسپانسیون آن با تزریق عمقی در عضله مدت زیادی سطح آنتی بیوتیک سرم را در حد متوسط نگه می دارد.

دی هیدرواستریتومایسین سولفات یک آمینوگلیکوزید است که با اتصال به جزء 30S ریبوزوم باعث ایجاد پروتئین های غیر کار آمد برای باکتری می شود. دی هیدرواستریتومایسین به همراه پنی سیلین اثر سینرژیک بر روی میکروبهایی گرم منفی دارد.

دگزامتازون نوعی کورتیکوئید است که به خاطر اثر ضد التهابی قوی (۳۵ بار قوی تر از کورتیزون) نقش به سزایی در مهار واکنشهای التهابی متعاقب بیماری های عفونی دارد. کلر فنآمین مالئات نوعی آنتی هیستامین است که از اثرات نامطلوب هیستامین پیشگیری می کند.

از ترکیب این چهار ماده در قالب HIPRACILINA-20 محصولی پدید می آید که حاوی آنتی بیوتیک های سینرژیک است و قادر به مبارزه با بیشتر عفونت ها می باشد.

موارد مصرف

گاو: متریت، عفونت های تنفسی، ورم پستان، آبسه ها، اپیدرمیت، سپتی سمی، ادم بدخیم، سیستیت، آرتریت و عفونت اندام های حرکتی
گوسفند و بز: پاستورلوزیس، ورم پستان، اپیدرمیت، لیستریوز، درمانیت بین انگشتی، عفونت های سم، آرتریت
خرگوش: آبسه های پوستی، ورم پستان، عفونت اندام حرکتی، عفونت دستگاه تناسلی و استافیلوکوکوزیس.

روش مصرف

تزریق داخل عضلانی (IM)

میزان مصرف

طبق نظر دامپزشک به طور معمول ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن یک تا دو نوبت در روز و به مدت سه روز تجویز می شود. بسته به شدت عفونت و تشخیص دامپزشک هر ۱۲-۲۴ ساعت و تا هر زمان که لازم باشد قابل مصرف است.

مدت زمان منع مصرف

شیر: ۳ روز (۶ وعده دوشش)
گوشت: ۳۰ روز

موارد منع مصرف

در حیواناتی که به ترکیبات این دارو حساسیت دارند و یا دچار نارسایی کلیوی هستند، مصرف نگردد.

موارد احتیاط

پیش از تزریق، موضع را ضد عفونی کنید. بطری را پیش از مصرف به خوبی تکان دهید. ممکن است پس از نگهداری طولانی، محتویات بطری حالت دو فاز پیدا کند. این مورد دلیلی بر ناکارآمد بودن محصول نیست. در صورت مسمومیت بر اثر افزایش دوز مصرف، مصرف دارو را قطع و درمان علامتی را آغاز کنید. به دلیل احتمال سقط، در حیوانات آبستن استفاده نشود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان با دیگر داروهای باکتریسید توصیه نمی شود.

اثرات جانبی

این محصول توکسیک نیست ولی در بعضی حیوانات ممکن است نشانه هایی از ازدیاد حساسیت بروز نماید.

شرایط نگهداری

در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

بطری ۱۰۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: شرکت سرور فجر

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری

پارسیان پخش اکسیر

