

HIPRAGUMBORO® BPL2

Inactivated vaccine, Newcastle disease and Gumboro disease

واکسن کشته علیه بیماری های گامبورو و نیوکاسل



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAGUMBORO BPL2

واکسن کشته علیه بیماری های گامبورو و نیوکاسل

ترکیب

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیر فعال (کشته) شده گامبورو، سویه وینترفیلد ۲۵۱۲ به میزان حداقل 10^7 TCID₅₀ و ویروس غیر فعال (کشته) شده نیوکاسل، سویه لاسوتا به میزان حداقل 10^9 EID₅₀ به همراه ادجوانت روغنی می باشد.

شکل واکسن

امولسیون تزریقی

موارد مصرف

پیشگیری از بیماری های نیوکاسل و گامبورو در گله های مادر و تخمگذار

روش مصرف

تزریق عضلانی در سینه یا زیر جلدی در ناحیه میانی پشت گردن در حیواناتی که گوشت آنها مورد مصرف انسانی قرار می گیرد توصیه می گردد که فقط به روش زیر جلدی استفاده گردد. در صورتی که تزریق زیر جلدی به درستی انجام نگیرد و به صورت داخل جلدی صورت گیرد، می تواند باعث تورم در ناحیه تزریق گردد. دمای واکسن در زمان تجویز در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد. واکسن را قبل و در حال انجام واکسیناسیون تکان دهید.

مقدار مصرف

۰/۵ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده.
واکسیناسیون در طیور بالغ می بایست قبل از شروع تخمگذاری انجام گیرد.
هرگونه بر نامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.

دوره منع مصرف

ندارد

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی)

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

