

# HIPRAPOX®

Live vaccine, fowl pox

واکسن زنده آبله ماکیان



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health



## توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴

[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)



# HIPRAPOX

## واکسن زنده آبله طیور

### ترکیب

این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته آبله سویه FPV-92 که هر دز آن حاوی حداقل  $10^{3.5} \text{EID}_{50}$  می‌باشد.

### موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری آبله طیور در گله های تخمگذار، مادر و بوقلمون (ماکیان و بوقلمون)

### روش مصرف

تلقیح در نسوج پرده بالی در ماکیان و تخریش فولیکول پر در ناحیه ران در بوقلمون.  
حل نمودن قرص لیوفیلیزه در حلال آن.  
سپس قبل از استفاده جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید.  
اپلیکاتور دو شاخه را که در بسته بندی ویالهای واکسن موجود است برای هر بار واکسیناسیون می بایست در داخل محلول واکسن وارد نمود.  
مرغ تخمگذار و مادر  
پرده بالی را باز نموده و سپس واکسن بوسیله اپلیکاتور دو شاخه در پرده بالی بدون ایجاد خونریزی تزریق شود.  
بوقلمون  
تلقیح واکسن از طریق تخریش فولیکول پر در ران

### مقدار مصرف

یک دز برای هر پرنده (ماکیان و بوقلمون)  
هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.

### دوره منع مصرف

ندارد

### شرایط نگهداری

در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید نگهداری شود.

### کنترل واکسیناسیون

۱۰-۷ روز پس از انجام واکسیناسیون، یک یا دو ندول در محل تزریق ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد پرنده واکسینه شده است. این ندولها که سپس تبدیل به دلمه شده اند ۲-۳ هفته پس از واکسیناسیون ناپدید خواهند شد.

### بسته بندی

بسته حاوی ۵ ویال ۱۰۰۰ دزی به همراه ۵ ویال حلال.

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

