

# HIPRAVIAR® **ILT**

Live vaccine against infectious Laryngotracheitis

واکسن لارنگوتراکئیت عفونی



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health



## توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴  
[www.parsianpaksh.com](http://www.parsianpaksh.com)



# HIPRAVIAR - ILT

## واکسن لارنگوتراکئیت عفونی

### ترکیب

هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته لارنگوتراکئیت عفونی، سویه CHP50 به میزان  $10^3 - 10^{3.5} \text{EID}_{50}$  می باشد.

### موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری لارنگوتراکئیت عفونی در گله های مادر و تخمگذار

### روش مصرف

قطره چشمی - بینی

### روش قطره چشمی - بینی

پس از تزریق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید و محلول تولیدی را با مابقی حلال مخلوط کنید. یک قطره واکسن (هر پرنده ۰/۰۳ میلی لیتر) را در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز) بچکانید.

### مقدار صرف

یک دز برای هر پرنده.

هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد. از تجویز واکسن کمتر از دواز (مقدار) توصیه شده جدا خودداری شود. هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید.

### دوره منع مصرف

ندارد.

### عوارض جانبی

واکسیناسیون با روش قطره چشمی ممکن است به ندرت موجب التهاب چشم شود که ۴-۵ روز بعد از واکسیناسیون ظاهر می شود و ۲-۳ روز بعد ناپدید می شود. در طی دوران تخمگذاری استفاده نشود.

### شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

### بسته بندی

ویال های ۱۰۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پاریسیان پخش اکسیر

