

HIPRAVIAR® CLON/H120

Live vaccine, Newcastle disease CL/79 and infectious bronchitis H120 strain

واکسن دوگانه نیوکاسل کلون + برونشیت H120



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAVIAR CLON/H120

واکسن دوگانه نیوکاسل کلون + برونشیت H120

ترکیب

هر دز این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته و کلون شده نیوکاسل، سویه کلون CL/79 با میزان حداقل $10^{6.5}EID_{50}$ و ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت، سویه H120 به میزان حداقل 10^3EID_{50} می باشد.

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل و برونشیت در گله های گوشتی، تخمگذار و مادر

روش مصرف

قطره چشمی-بینی، آب آشامیدنی و اسپری

روش قطره چشمی-بینی

تزریق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، سپس جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید. چکاندن یک قطره واکسن (هر پرنده ۰/۰۳ میلی لیتر) در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز)

روش آشامیدنی

بعد از آماده سازی واکسن، محلول آماده شده را در میزان مناسبی از آب آشامیدنی مخلوط نموده که آب حاوی واکسن باید در عرض ۱ الی ۲ ساعت توسط طیور مصرف گردد. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد، تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد.

روش اسپری

جهت انجام این روش در ابتدای بایست دستگاه اسپری (HIPRA WILMA TIMER) را به لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. همیشه ویال واکسن در زیر آب باز گردد. از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نموده. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد و تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد. برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی (سنین بالاتر) می توان از اسپری با قطرات ریز طبق توصیه کارخانه سازنده دستگاه اسپری استفاده نمود. هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظت کننده عینک استفاده نمود.

مقدار مصرف

یک دز برای هر پرنده (گوشتی، تخمگذار و مادر).

هرگونه بر نامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد. در مناطقی که بیماری نیوکاسل بومی می باشد، می توان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود.

از تجویز واکسن کمتر از دزاژ (مقدار) توصیه شده جدا خودداری شود و هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید، در صورتی که تعداد پرندگان با تعداد دزهای موجود در ویال ها یکسان نباشد، می بایست از دز بالاتر استفاده گردد.

دوره منع مصرف

ندارد

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

ویالهای ۲۵۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).



شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر