

# HIPRAVIAR<sup>®</sup> TRT

Inactivated vaccine, swollen head syndrome and turkey rhinotracheitis  
**CHICKEN ORIGIN**

واکسن کشته سندرم کله بادی طیور و رینوتراکئیت بوقلمون



The Reference  
in Prevention  
for Animal Health



## توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴  
[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)



# HIPRAVIAR TRT

واکسن کشته سندرم کله بادی طیور و رینوتراکئیت بوقلمون

## ترکیب

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیر فعال (کشته) رینوتراکئیت (سندرم کله بادی) سویه ۱۰۶۲، تحت تیپ B، با منشا ماکیان و به میزان حداقل  $10^6$  TCID<sub>50</sub> به همراه ادجوانت روغنی می باشد.

## موارد مصرف

جهت پیشگیری از سندرم کله بادی (SHS) در گله های تخمگذار و مادر.  
جهت پیشگیری از رینوتراکئیت در بوقلمون.

## روش مصرف

داخل عضلانی، در عضله سینه و یا زیر جلدی در ناحیه میانی پشت گردن.  
در حیواناتی که گوشت آنها مورد مصرف انسانی قرار می گیرد توصیه می گردد که فقط به روش زیر جلدی استفاده گردد.  
در صورتی که تزریق زیر جلدی به درستی انجام نگیرد و به صورت داخل جلدی صورت گیرد، می تواند باعث تورم در ناحیه تزریق گردد.  
دمای واکسن در زمان تجویز می بایست همانند دمای اتاق بین ۱۵-۲۰ درجه سانتی گراد باشد.  
واکسن را قبل و در طی انجام واکسیناسیون تکان دهید.

## مقدار مصرف

یک دز واکسن برای هر پرنده.  
واکسیناسیون در طیور بالغ و بوقلمون می بایست قبل از شروع تخمگذاری انجام گیرد.  
هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.

## دوره منع مصرف

ندارد.

## شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

## بسته بندی

ویالهای ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دوزی).



شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت واردکننده: کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر