




**Products and People  
You can rely on!**

## INTERTRIM-500

اینترتрім-۵۰۰

سوسپانسیون خوراکی حاوی سولفادیازین + تری متوپریم



### توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴  
[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)





# INTERTRIM-500

سوسپانسیون خوراکی حاوی سولفادiazین + تری متوپریم

## گروه دارویی

سوسپانسیون خوراکی

## ترکیب دارویی

هر میلی لیتر اینترتريم - ۵۰۰ حاوی  
سولفادiazین ۴۰۰ mg  
تری متوپریم ۱۰۰ mg

## اثرات جانبی

پس از درمان طولانی و یا دوز بالا، کریستالوری می تواند ایجاد شود. در صورت مشاهده علائم کریستالوری (هماچوری و کولیک کلیه)، درمان می بایست بلافاصله متوقف و به عنوان مثال کربنات سدیم (قلیایی کننده ها) جهت افزایش حلالیت سولفادiazین در ادرار مصرف گردد. همچنین تجویز برای مدت طولانی خطر ایجاد اختلالات خونی را افزایش می دهد. (آنمی، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی)

## شرایط نگهداری

دور از نور و در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد

## بسته بندی

بطری پلی اتیلنی ۵۰۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: اینتر کمی هلند

شرکت وارد کننده: پارمیس درمان

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

## مکانیسم اثر

ترکیب سولفادiazین و تری متوپریم به صورت سینرژیک عمل می نماید. سولفادiazین از تبدیل پاراآمینوبنزوئیک به اسید دی هیدروفولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت بعمل می آورد. این دو ماده با اثر سینرژیک دارای خاصیت باکتریسیدی هستند و با مکانیسم فوق بر روی بسیاری از باکتری های گرم منفی نظیر اشریشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا و سالمونلا و گرم مثبت نظیر استافیلوکوک و گونه های استرپتوکوک موثر می باشند.

## موارد مصرف

عفونت دستگاه های گوارشی و تنفسی ایجاد شده توسط میکروارگانیزم های حساس به سولفادiazین و تری متوپریم مانند اشریشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوک و گونه های استرپتوکوک در طیور، گوساله، بره و بزغاله.

## میزان و روش مصرف

طیور: ۵۰۰ میلی لیتر از سوسپانسیون اینترتريم - ۵۰۰ برای هر ۲۰۰۰-۱۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۴ روز  
گوساله، بره و بزغاله: ۵ میلی لیتر از سوسپانسیون اینترتريم - ۵۰۰ برای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن دام، دوبار در روز و به مدت ۷-۴ روز

## مدت زمان پرهیز از مصرف

گوشت گوساله، بره و بزغاله: ۸ روز  
گوشت طیور: ۵ روز

## موارد منع مصرف

حساسیت به تری متوپریم و یا سولفانامیدها.  
تجویز در حیواناتی که مشکلات کلیوی، کبدی یا اختلالات خونی دارند.

## موارد احتیاط

در گوساله، بره و بزغاله تنها پیش از شروع نشخوار مصرف گردد.  
بطری دارو را قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.

