



**Products and People  
You can rely on!**

## INTROCIL PUMP

**پمپ اینتروسیل**

محلول خوراکی ضد اسهال و عفونت های دستگاه گوارش



**توزیع انحصاری**

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶۵۹ ۲۰ ۶۴  
[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)



## گروه دارویی

آنتی بیوتیک - محلول خوراکی

## ترکیب دارویی

هر میلی لیتر حاوی

کلیستین سولفات: ۲۰۰۰۰۰ IU

اسپکتینومایسین: ۵۰ mg

## مکانیسم اثر

ترکیب کلیستین و اسپکتینومایسین دارای اثر هم افزایی (سینرژسم) بر روی یکدیگر می باشد. کلیستین آنتی بیوتیکی از گروه پلی میکسین ها است که با تاثیر بر غشای سلولی و تغییر در میزان نفوذپذیری آن باعث مرگ سلول باکتری می شود. کلیستین تا حدودی می تواند موجب خنثی سازی اندوتوکسین باکتری ها نیز شود. اثر ضدباکتریایی کلیستین، بیشتر بر روی باکتری های گرم منفی مانند *Salmonella*, *Haemophilus* و *E.coli* می باشد.

## روش مصرف

خوراکی

## میزان مصرف

۲ بار در روز و یک دز به ازای ۳-۲/۵ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز.

هر بار فشار پمپ، یک دز معادل یک میلی لیتر دارو را خارج می نماید.

## مدت زمان منع مصرف

گوشت: ۷ روز

## موارد منع مصرف

در حیواناتی که حساسیت به کلیستین و اسپکتینومایسین دارند و همچنین در گوساله هایی که دارای مشکلات دستگاه ادراری هستند، نباید مصرف شود.

## تداخل دارویی

تجویز همزمان این دارو با کاتیون های دو ظرفیتی، اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی موجب ایجاد تداخل دارویی می شود.

## اثرات جانبی

ندارد

## شرایط نگهداری

در جای خنک و تاریک نگهداری شود.

## بسته بندی

بطری ۱۰۰ میلی لیتری به همراه پمپ

شرکت سازنده: شرکت اینتر کمی هلند

شرکت وارد کننده: شرکت آبتین پارس پرور

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

## موارد مصرف

**بره و بزغاله:** درمان اسهال و عفونت های دستگاه گوارشی ایجاد شده توسط باکتری های گرم منفی که به کلیستین و اسپکتینومایسین حساس می باشند.

**گوساله:** درمان عفونت های دستگاه گوارش و اسهال های عفونی ناشی از *Salmonella* و *E.coli*, *Haemophilus*.

