



INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LIMITED

Raksha-ET

واکسن کشته علیه بیماری آنتر و توکسمی



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۵۴ ۵۲ ۹۳ ۶۶ - ۴۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶
نمابر: ۶۴ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com





INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LIMITED

RAKSHA-ET

واکسن کشته علیه بیماری آنترتوکسمی

واکسیناسیون حیوانات آبستن و شیرده

واکسن راکشا-ای-تی جهت استفاده در حیوانات آبستن و شیرده بی خطر می باشد.

در صورت واکسیناسیون حیوانات آبستن در مرحله انتهایی آبستنی مراقبت بیشتری جهت جلوگیری از استرس به حیوان باید صورت گیرد.

اثرات جانبی

بطور معمول هیچ عوارض جانبی بعد از واکسیناسیون مشاهده نمی شود. با این حال در موارد کمی ممکن است محل واکسینه یک تورم کوچک که معمولاً طی چند روز از بین می رود، مشاهده شود.

دوره پرهیز از مصرف

ندارد

مصرف بیش از حد (overdose)

در آزمایش های صورت گرفته با افزایش دوز به میزان دو برابر در حیوان هدف هیچگونه واکنش ناخواسته ای مشاهده نشده است.

عمر قفسه ای

۲ سال

شرایط نگهداری

واکسن ها در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. از فریز کردن واکسن اجتناب کنید.

بسته بندی

واکسن RAKSHA-ET در ویال های ۱۰۰ میلی لیتری (۵۰ دوزی) تولید می گردد.

تولید کننده

شرکت INDIAN IMMUNOLOGICALS LIMITED

وارد کننده

شرکت پارمیس درمان

توزیع کننده

شرکت پارسیان پخش اکسیر



بیماری قلوه نرمی یا آنترتوکسمی در گوسفند توسط کلستریدیوم پرفرنزنس ایجاد می شود. نام دیگر این بیماری پرخوری می باشد چراکه از عوامل ایجاد کننده آن تغذیه زیاد از جیره سرشار از غلات و علوفه تازه و آبدار می باشد. این باکتری جزء فلور میکروبی نرمال گوسفند می باشد که برخی عوامل مانند پرخوری و تغییر ناگهانی جیره در میزان علوفه تازه و آبدار بدلیل عدم آمادگی میکرو فلور شکمبه و متعاقباً رسیدن مقادیر زیاد کربوهیدرات حاصله از جیره و یا شیر به روده ها باعث تکثیر باکتری کلستریدیوم پرفرنزنس و هجوم این باکتری به بخش های ابتدایی روده باریک می شود. با تکثیر شدید این باکتری مقادیر زیادی سم تولید می گردد که با اثرگذاری آنزیم های روده ای تبدیل به یک سم مرگ بار شده و متعاقباً باعث ایجاد نشانه های بالینی و مرگ در دام می گردد.

ترکیب

هر دز واکسن راکشا-ای-تی حاوی محیط کشت و توکسوئید غیر فعال شده کلستریدیوم پرفرنزنس Type D به همراه ادجوانت (یاور) هیدروکسید آلومینیوم می باشد. مواد دیگر تشکیل دهنده واکسن شامل نگهدارنده و فسفات بافر بعنوان حلال می باشد.

موارد مصرف

واکسن راکشا-ای-تی جهت ایجاد ایمنی و پیشگیری از بیماری آنترتوکسمی، پرخوری و یا قلوه نرمی در گوسفند و بز می باشد.

دوزاژ

گوسفند و بز: ۲ میلی لیتر

روش مصرف

واکسن باید به صورت زیرپوستی در یک ناحیه خشک و تمیز پوست با رعایت تمام اقدامات احتیاطی در برابر آلودگی تزریق شود.

برنامه واکسیناسیون

واکسیناسیون اولیه: از سن ۴ ماهگی و بالاتر.
واکسیناسیون یادآور: سالانه تکرار شود.

احتیاط های ضروری

- واکسیناسیون تنها در دام های سالم توصیه می شود.
- در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت فرد واکسیناتور با دردست داشتن مشخصات واکسن به مراکز درمانی منتقل شود.
- ویال واکسن باید قبل از مصرف کاملاً تکان داده شود.
- بطری، سرنگ ها و سرسوزن های استفاده شده در زباله های مخصوص امحاء شده و از ریختن آنها در زباله های خانگی پرهیز شود.