



INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LIMITED

Raksharab

واکسن کشته هاری



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com





INDIAN
IMMUNOLOGICALS
LIMITED

RAKSHARAB

واکسن کشته هاری

بیماری هاری یک بیماری ویروسی زئونوز (مشترک) بسیار مرگ بار می باشد که میزبان اولیه آن پستانداران می باشند و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون به موقع می باشد.

ترکیب

هر یک میلی لیتر از واکسن کشته راکشا - راب حاوی آنتی ژن ویروس هاری به میزان $1.0 \text{ IU} \geq$ (ویروس هاری سویه CVS، تکثیر یافته بروی محیط کشت سلولی) به همراه ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم می باشد. مواد دیگر تشکیل دهنده واکسن شامل تیومر سال (نگهدارنده) و فسفات بافر (حلال) می باشد.

توضیح

واکسن حاوی ویروس هاری کشت یافته بر روی کشت سلولی می باشد.

موارد مصرف

واکسن راکشا راب جهت پیشگیری و ایمن سازی سگ ها و سایر حیوانات اهلی مورد استفاده قرار می گیرد.

دوز و روش مصرف

یک میلی لیتر بصورت داخل عضلانی و یا زیر جلدی با رعایت تمام اصول تزریق.

برنامه واکسیناسیون

این واکسن جهت ایمن سازی علیه بیماری هاری و تنها بعنوان پیشگیری استفاده می شود.

نوع برنامه واکسیناسیون	اولین واکسن	دومین واکسن	واکسیناسیون مجدد
جهت پیشگیری	۳ ماهگی (۱۲ تا ۱۳ هفتگی) و یا بالاتر (در صورتیکه واکسیناسیون زیر ۳ ماهگی زده شود زدن یک واکسیناسیون بوستر (یادآور) در ۳ ماهگی توصیه میگردد).	۴ هفته بعد از اولین واکسیناسیون در صورتی- که اولین واکسن در ۳ ماهگی زده شده باشد.	سالانه تکرار گردد

ایمن زایی

این واکسن قادر به ایجاد ایمنی برای مدت ۳۶ ماه (سه سال) می باشد، با این حال واکسیناسیون سالانه در مناطقی که بیماری آندمیک می باشد توصیه می گردد.

مواد منع مصرف

واکسیناسیون نباید بر روی حیوانات بیمار، تحت هرگونه شرایط استرس زا (مانند حمل و نقل) و یا در دوران نقاهت بیماری صورت گیرد. همچنین حیوانات تب دار، دچار فقر غذایی، عفونت پوستی، عفونت انگلی و حیوانات تحت درمان با کورتیکواستروئیدها نباید واکسینه گردند.

احتیاط

در موارد واکنش آلرژیک پس از واکسیناسیون، درمان دارویی متناسب با استفاده از آدرنالین، کورتیکواستروئیدها و یا سایر درمان های ضد آلرژیک می بایست تحت نظارت دامپزشک صورت گیرد.

اثرات جانبی

۱- بصورت کلی هیچ واکنش جانبی مشاهده نمی شود.
۲- گاهی یک برآمدگی کوچک در ناحیه تزریق ایجاد می گردد که پس از چند روز برطرف می گردد.

واکسیناسیون حیوانات آبستن و شیرده

واکسن راکشا راب جهت استفاده در حیوانات آبستن و شیرده بی خطر می باشد. در صورت واکسیناسیون حیوانات آبستن در مراحل انتهایی آبستنی مراقبت بیشتری جهت جلوگیری از استرس به حیوان باید صورت گیرد.

دوره منع مصرف

ندارد.

مصرف بیش از حد (overdose)

در آزمایش های صورت گرفته با افزایش دوز به میزان دو برابر در حیوان هدف هیچگونه واکنش ناخواسته ای مشاهده نشده است.

شرایط نگهداری و حمل و نقل واکسن

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
توانایی تولید آنتی بادی واکسن در صورت عدم نگهداری در محدوده دمایی ۲-۸ درجه کاهش می یابد و میزان این کاهش بستگی به دما و زمان نگهداری دارد. از انجماد واکسن اجتناب گردد و در صورت مشاهده هرگونه یخ زدگی در محتویات واکسن، ویال کاملاً دور ریخته شود.

عمر قفسه ای

عمر مفید واکسن در صورت نگهداری در شرایط استاندارد (۸ تا ۲ درجه سانتی گراد) ۳۶ ماه پس از تولید می باشد.

چگونگی دور ریز بطری های استفاده شده

بطری ها، سرنگ ها و سرسوزن های استفاده شده بر اساس توصیه و مقررات دور ریخته شود.

بسته بندی

واکسن راکشا-راب در ویال های ۱، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی لیتری تولید می گردد.

تولید کننده

شرکت INDIAN IMMUNOLOGICALS LIMITED

وارد کننده

شرکت پارمیس درمان

توزیع کننده

شرکت پارسیان پخش اکسیر

