

ESPONJAVET

اسفنج کاشتنی گوسفندی



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



ESPONJAVET

اسفنج کاشتنی گوسفندی

گروه دارویی

هورمون - اسفنج کاشتنی گوسفندی

ترکیب دارویی

هر اسفنج حاوی

مدروکسی پروژسترون استات 60 mg

مکانیسم اثر

مدروکسی پروژسترون استات یک آنالوگ سنتتیک از پروژسترون طبیعی است. این هورمون از رها شدن FSH و LH هیپوفیزی جلوگیری می کند و اوولاسیون را به تاخیر می اندازد. پس از خارج نمودن اسفنج حاوی پروژسترون، حیوان اگر در فصل تولید مثل باشد، علائم استروس را بروز خواهد داد. در حیوانات مبتلا به آنستروس درمان توام اسفنج حاوی مدروکسی پروژسترون استات و PMSG سبب ایجاد و تکامل فاز فولیکولار و بروز استروس و اوولاسیون می گردد.

موارد مصرف

میش و بز ماده: همزمانی استروس و ایجاد فحلی اسفنج کاشتنی (ESPONJAVET) اگر به همراه PMSG استفاده شود، باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد. هدف استفاده از این اسفنج ایجاد شرایط یکسان از نظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات ماده گله می باشد به طوری که باعث ایجاد فاز لوتئال می شود.

روش مصرف

اسفنج بایستی به وسیله ی اپلیکاتور مخصوص آن که قبلا ضد عفونی شده در داخل واژن جاگذاری شود. جهت ضد عفونی اپلیکاتور از الکل، کرزول و فنل نباید استفاده کرد.

میزان مصرف

یک اسفنج برای هر حیوان استفاده شود. اسفنج باید ۱۲ تا ۱۴ روز داخل واژن باقی بماند اسفنج ۱۴ روز بعد از جاگذاری در مرحله آنستروس خارج و همزمان ۵۰۰ واحد PMSG به صورت عضلانی تزریق شود.

مدت زمان منع مصرف

ندارد

موارد منع مصرف

در حیواناتی که نسبت به مدروکسی پروژسترون از دیاد حساسیت دارند نباید مصرف شود. در حیوانات ماده ای که ترشح واژن داشته یا اخیرا سقط کرده اند یا بیمار هستند نباید تجویز گردد. در طول دوره آبستنی استفاده نشود.

هشدار

باقی ماندن اسفنج در واژن بیش از زمان توصیه شده ممکن است باعث تحریک واژن و تغییرات اندومتریک گردد.

تذکر

قبل از استفاده از اسفنج حیوان باید از نظر جنسی بالغ و از سلامت برخوردار باشد.

اگر گوسفند و بز تاکنون زایمان نکرده بایستی حداقل ۷ ماه سن و وزنی معادل ۷۰٪ وزن حیوان بالغ داشته باشد.

در صورتی که بدلیل وجود شرایط غیر طبیعی جاگذاری اسفنج بوسیله اپلیکاتور با مشکل همراه است زیر نظر دکتر دامپزشک اسفنج کار گذاشته شود.

موارد احتیاط

هنگام استفاده از اسفنج از دستکش استفاده شود. اسفنج یکبار مصرف بوده پس از استفاده باید با ملاحظات زیست محیطی دور انداخته شود. البته اگر سوزانده شود بهتر است.

تداخل دارویی

تا کنون مواردی مبنی بر تداخل دارویی گزارش نشده است.

شرایط نگهداری

در محل خشک و خنک دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی


بسته حاوی ۲۵ عدد اسفنج

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: شرکت کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

نمودار روش ایجاد استروس در گوسفند و بز



زمان مصرف

گرچه می توان به وسیله اسفنج در حیوانات ماده شیرده استروس ایجاد نمود، اما کارایی لازم را ندارد. بنابراین بهتر است حداقل بعد از ۷۵-۶۰ روز پس از زایمان و در ابتدای دوره جنسی کار گذاشته شود.

