

واکسن کشته علیه آلودگی به کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس

• ترکیب

هر دوز واکسن اینموا (۲ میلی لیتر) به صورت سوسپانسیون تزریقی و شیری رنگ و ادجوانت (یاور) هیدروکسید آلومینیوم و دی اتیل آمینوتیل دکستران (DEAE-Dextran) حاوی ترکیبات زیر می باشد:

RP* \geq 1 A22 باکتری کشته کلامیدیا آبورتوس سویه

RP* \geq 1 Sao باکتری کشته سالمونلا آبورتوس اویس سویه

* قدرت نسبی

ارزیابی پتانسیل نسبی این واکسن توسط روش استاندارد الایزا نشان می دهد که این واکسن به طور کامل موثر می باشد.

• موارد مصرف

پیشگیری از سقط، مرده زایی، مرگ و میر (تلغات) زودرس بره ها و بزغاله ها و سایر بیماریهای تولید مثلی ناشی از کلامیدیا آبورتوس و سالمونلا آبورتوس اویس و کاهش دفع این پاتوزن ها از حیوانات آلوده

در صورت واکسیناسیون طبق برنامه های پیشنهادی واکسن می تواند در تمام دوره آبستنی دام ها را حفاظت نماید.

• اثرات جانبی

واکنش بافتی موضعی ملموس ممکن است در محل تزریق تقریباً "یک هفته پس از تزریق واکسن دیده شود. در اغلب موارد این واکنش جزئی یا ملایم است که ظرف مدت دو هفته بدون نیاز به هرگونه درمان رفع می گردد. افزایش درجه حرارت بدن تا یک درجه سانتیگراد ممکن است یک روز پس از واکسیناسیون دیده شود. این افزایش مختصر درجه حرارت بصورت خودبخودی طی ۲۴ ساعت از بین خواهد رفت.

• گونه های هدف

گوسفند و بز

• میزان و نحوه مصرف

برای استفاده میش از ۵ ماهگی به بعد

۲ میلی لیتر به صورت تزریق زیر جلدی در ناحیه پشت شانه در محوطه دنده

جهت اینمی زایی و حفاظت مناسب حیوانات می باشد دو دوز واکسن با فاصله سه هفته دریافت نمایند. اولین دوز می باشد ۵ هفته پیش از تلقیح یا جفت گیری انجام گیرد سپس دوز دوم سه هفته بعد تزریق گردد. سپس واکسیناسیون یادآور سالیانه باید دو هفته قبل از تلقیح مصنوعی یا جفت گیری یا در طول مرحله اول آبستنی صورت پذیرد.

واکسیناسیون کلی گله بر اساس برنامه ریزی سالیانه به تمامی دام های آبستن و غیر آبستن توصیه می شود.

• ملاحظات قبل از تجویز واکسن

- واکسیناسیون فقط در دام های سالم انجام شود.
- تجهیزات استریل برای واکسیناسیون استفاده گردد.
- واکسیناسیون بلا فاصله بعد از باز کردن شیشه انجام شود.
- توصیه میگردد دمای واکسن در زمان تجویز بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد.
- شیشه های واکسن قبل از تجویز خوب تکان داده شود.

• دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

• شرایط نگهداری

- واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری و حمل شود. ویال های واکسن از انجماد و نور محافظت شود.
- استفاده از واکسن های منقضی (بر اساس تاریخ درج شده بر روی لیبل دارو) به هیچ وجه توصیه نمی شود.

• احتیاط های ضروری

- واکسیناسیون تنها در دام های سالم توصیه می شود.
- در صورت مشاهده هرگونه نشانه از دیابد حساسیت در دام ها که بدلیل مواد موجود در ادجوانات (یاور) می تواند رخ دهد، واکسیناسیون در دام های حساس نباید صورت گیرد.
- در صورت تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور، به سرعت فرد واکسیناتور با در دست داشتن مشخصات واکسن به مراکز درمانی منتقل شود.
- تجویز واکسن تا دو برابر دوز توصیه شده باعث بروز علائم و اثرات جانبی در حیوان نمی شود.
- از مخلوط کردن این واکسن با دیگر ترکیبات دارویی پرهیز شود.
- بطری ها، سرنگ ها و سرسوزن های استفاده شده بر اساس قوانین محلی دور ریخته شود.

واکسیناسیون دام های آبستن و شیرده:

با وجود اینکه واکسیناسیون جهت استفاده در دام های آبستن و شیرده بی خطر می باشد. استفاده از واکسن به دلیل ایجاد استرس در حیوان در ماه آخر آبستنی توصیه نمی شود.

- **تداخل دارویی**

تا کنون موردی گزارش نشده است.

- **عمر قفسه ای**

۲ سال

- **بسته بندی**

واکسن اینموا در بسته های حاوی ویال های ۵ دوزی (۱۰ میلی لیتر)، ۲۵ دوزی (۵۰ میلی لیتر)، ۵۰ دوزی (۱۰۰ میلی لیتر) و ۱۲۵ دوزی (۲۵۰ میلی لیتر) تولید و عرضه می گردد.

- **شرکت تولید کننده**

هیپرا اسپانیا

- **شرکت وارد کننده**

سرور فجر

- **توزیع کننده**

شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر