

Oxilabicyclina Retard 200 mg/ml LA

اکسی تتراسایکلین ۲۰٪ (طولانی اثر)
(محلول استریل تزریقی)



توزیع انحصاری
تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کد پستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمبر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



گروه دارویی

آنتی بیوتیک - محلول تزریقی

ترکیب دارویی

هر میلی لیتر حاوی

اکسی تتراسایکلین (دهیدراته) ۲۰۰ میلی گرم

سدیم فرمالدهید سولفوکسیلات ۴ میلی گرم

مکانیسم اثر

تتراسایکلین ها وسیع الطیف می باشند و بر باکتری های گرم مثبت، منفی، مایکوپلاسماها، کلامیدیا، موراکسلا و ریکتزیا اثر دارند. این خانواده با اتصال به واحد 30s ریبوزوم باعث ممانعت از متابولیسم گلوتامیک اسید شده که در ادامه مانع سنتز پروتئین و نابودی طیف وسیعی از باکتری می گردد. به نظر می رسد تتراسایکلین ها بر روی واحد 50s ریبوزوم ها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذپذیری و اختلال در متابولیسم باکتری می گردند.

موارد مصرف

گاو: عفونت های تنفسی ناشی از هیستوفیلوس سامنی، منهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا (تب حمل و نقل) و مایکوپلاسما بویس.

عفونت های تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز

عفونت های سم ناشی از دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتلا ملانینوجنیکوس

گوسفند و بز: عفونت های تنفسی ناشی از منهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا

عفونت های تناسلی ناشی از آرکانوباکتریوم پایوژنز و کلامیدیا آبورئوس

عفونت های سم ناشی از درماتوفیلوس کونگولنسیس، دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتلا ملانینوجنیکوس

موارد استفاده در سایر عفونت ها

عفونت پستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و ای کولای

سقط آنزوتیک ناشی از کلامیدیا آبورئوس، کلامیدیا پسیناسی.

پلی آرتريت ناشی از گونه های کلامیدیا و مایکوپلاسما.

روش مصرف

تزریق داخل عضلانی عمیق

گاو: عضله گردن

گوسفند و بز: عضله ران

میزان مصرف

گاو، گوسفند، بز: یک تزریق به میزان ۲۰ میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن)

لازم به ذکر است در گاو بیشتر از ۱۰ میلی لیتر و گوسفند و بز بیشتر از ۳ میلی لیتر در یک محل تعیین شده تزریق نگردد و در صورت نیاز به

تزریق های بیشتر در محل های متفاوت تزریق صورت گیرد.

مدت زمان منع مصرف

گاو

گوشت: ۲۲ روز

شیر: ۹ روز

گوسفند و بز

گوشت: ۲۰ روز

شیر: ۹ روز

تداخلات دارویی

همزمان با کاتیون های ۲ و ۳ ظرفیتی (کلسیم، منیزیم، آهن و مس) استفاده نشود.

تتراسایکلین ها ممکن است با خواص باکتری کشی داروهای پنیسیلینی، سفالوسپورینی و آمینوگلیکوزیدی تداخل داشته باشد.

موارد منع مصرف

در حیواناتی که از دیاد حساسیت به تتراسایکلین ها یا مواد جانبی داخل دارو دارند و همچنین در حیواناتی که دارای اختلال عملکردی کلیه و کبد هستند

نیز مصرف نگردد.

در سگ، گربه و اسب مصرف نگردد.

عوارض جانبی

ممکن است واکنش محیطی گذرا در اطراف محل تزریق (تورم و درد) ایجاد گردد.

همانند تمام تتراسایکلین ها، واکنش های آلرژیک و حساسیت خفیف نیز ممکن است رخ دهد.

در حیوانات جوان، ممکن است بر اثر رسوب تتراسایکلین رنگ غیرعادی بر روی دندان و استخوان ها ایجاد گردد.

ممکن است باعث اختلالات گوارشی شود.

موارد احتیاط

در صورت خود تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کرده و بروشور یا برچسب آن را نشان دهید.

افراد دارای از دیاد حساسیت به تتراسایکلین ها باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداری کنند.

از تماس دارو با چشم و پوست خودداری گردد و اگر در معرض چشم قرار گرفت، سریعاً موضع را با آب فراوان بشویید.

شرایط نگهداری

در دمای بین ۲۵-۱۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری گردد.

حداکثر ۲۸ روز پس از باز کردن درب دارو مصرف گردد.

بسته بندی

ویال های ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتری

شرکت تولید کننده: لابیانا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

