

Tilosina Labiana 200 mg/ml

تایلوژین تارتارات ۲۰٪
(محلول استریل تزریقی)



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کد پستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمبر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



گروه دارویی

آنتی بیوتیک - محلول تزریقی

ترکیب دارویی

هر میلی لیتر حاوی

(تارتارات) ۲۰۰ میلی گرم

بنزیل الکل (E1519) ۵ میلی گرم

مکانیسم اثر

ماکروئیدها وسیع الطیف می باشند و بر باکتری های گرم مثبت، برخی باکتری های گرم منفی ها (غیر از کلی فرم ها) و مایکوپلاسما اثر دارند. این خانواده دارویی با اثر بر قسمت 50s ریبوزوم مانع ساخت پروتئین و باعث نابودی باکتری ها می گردد.

موارد مصرف

گاو : عفونت های تنفسی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم. عفونت های سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم

روش مصرف

تزریق داخل عضلانی عمیق

میزان مصرف

گاو : ۲۰-۱۰ میلی گرم تایلوژین به ازای هر کیلو وزن بدن در روز (برابر با ۱-۰/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن در روز) به مدت ۵ روز متوالی. لازم به ذکر است در گاو بیشتر از ۲۵ میلی لیتر در یک محل تزریق نگردد و در صورت نیاز به تزریق های بیشتر در محل های متفاوت تزریق صورت گیرد.

مدت زمان منع مصرف

گاو

گوشت: ۳۳ روز

شیر: ۵ روز

تداخلات دارویی

همزمان با فلورفنیکول، لینکوز آمیدها و دیگر ماکروئیدها که مانند تایلوژین روی قسمت 50s ریبوزوم تأثیر دارند استفاده نگردد.

موارد منع مصرف

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به تایلوژین و دیگر ماکروئیدها دارند و همچنین در حیواناتی که دارای اختلال عملکردی کلیه و کبد هستند نیز مصرف نگردد. در اسب ها و دیگر تک سمی ها اکیدا مصرف نگردد.

عوارض جانبی

ممکن است افزایش نبض، افزایش تنفس و تورم فرج (ولوا) ایجاد گردد. واکنش های آلرژیک و شوک آنافیلاکسی ممکن است به صورت نادر رخ دهد.

موارد احتیاط

تایلوژین ممکن است باعث سوزش و تحریکات پوستی شود.

در صورت خود تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کرده و بروشور یا برچسب آن را نشان دهید.

افراد دارای ازدیاد حساسیت به ماکروئیدها مانند تایلوژین باید از هرگونه تماس با این فرآورده دارویی دامپزشکی خودداری کنند.

از تماس دارو با چشم و پوست خودداری گردد و اگر دارو در معرض چشم یا پوست قرار گرفت، سریعاً موضع را با آب فراوان بشویید.

شرایط نگهداری

در دمای بین ۲۵-۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.

حداکثر ۲۸ روز پس از باز کردن درب دارو مصرف گردد.

بسته بندی

ویال های ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتری

شرکت تولید کننده: لابیانا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

