

HIPRAVIAR AP




واکسن کشته اختصاصی بیماری نیوکاسل کبوتر



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمبر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAVIAR AP

واکسن کشته (اختصاصی بیماری نیوکاسل کبوتر)

ترکیب

هر دوز از این واکسن حاوی ویروس غیرفعال شده پارامیکسو ویروس ۱، سویه کبوتر (۱۲۸۲) با قدرت تولید آنتی بادی ۴ واحد بر مبنای آزمایش ممانعت از هماگلو تیناسیون می باشد. (HAI ۱/۱۶) ≥.

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل در کبوتر (سویه پارامیکسو ویروس کبوتر) شامل کبوتران مسابقه، نمایشی، خانگی و کبوتران پرورشی.

نشانه های بالینی نیوکاسل در کبوتر

مهمترین نشانه های بالینی نیوکاسل در کبوتر عدم تعادل، پیچش گردن و فلجی در سایر اندام ها مانند بال ها و پاها می باشد. سایر نشانه ها با اختصاصیت کمتر شامل کاهش مصرف غذا، آب، کاهش وزن و اسهال آبی (سبز رنگ) می باشند.

شکل واکسن

سوسپانسیون تزریقی

مقدار و روش مصرف

۰/۲ میلی لیتر بصورت زیرجلدی یا داخلی عضلانی. واکسیناسیون می بایست به صورت سالانه صورت گیرد در مناطق با شیوع بالای بیماری (مناطق اندمیک) ترجیحا دوبار واکسیناسیون در سال به فاصله ۶ ماه یکبار توصیه می گردد. کبوتران جوان را می توان از سن ۳۰-۳۵ روزگی واکسینه نمود.

روش های تزریق واکسن

تزریق زیرجلدی

در تزریق زیرجلدی در ناحیه میانی پشت گردن جهت جلوگیری از تورم و التهاب می بایست از تزریق در داخل جلد و یا داخل عضله گردن اجتناب گردد. همچنین بدلیل وجود عروق مهم و متعدد در دو طرف گردن از تزریق در آن ناحیه خودداری شود. جهت تزریق زیر پوست در ناحیه میانی پشت گردن پس از مقید نمودن پرنده و ضد عفونی محل تزریق با الکل، پوست ناحیه گردن در قسمت میانی پشت گردن را ما بین انگشت شست و اشاره گرفته و به سمت بالا کشیده و سپس با احتیاط سر سوزن را که می تواند به سمت بدن یا سر پرنده باشد داخل پوست وارد فضای خالی که توسط کشیدن پوست ایجاد شده وارد نموده سپس واکسن را تزریق می نمایم.

تزریق داخل عضله سینه

در صورتی که از پرنده جهت مسابقه و یا پرواز طولانی در چندین روز آینده نمی خواهیم استفاده نمایم می توان واکسن را در عضله سینه تزریق نمود. جهت جلوگیری از تزریق واکسن در داخل محوطه

شکمی و صدری از وارد نمودن عمیق سر سوزن در داخل عضله سینه اجتناب گردد.

موارد احتیاط

- تنها پرندگان سالم واکسینه شوند.
- در صورتی که تزریق زیر جلدی به درستی صورت نگیرد و تزریق بصورت داخل جلدی یا داخل عضلانی در گردن انجام پذیرد متعاقبا در ناحیه تزریق تورم ایجاد خواهد شد.
- در صورتی که در زمان تزریق سوزن وارد رگ خونی شود و خون وارد سرنگ گردد، سرنگ را به سرعت خارج نموده و در تزریق در نقطه ای دیگر صورت گیرد.
- در صورت باز شدن درب ویال واکسن توصیه می گردد در سریعترین زمان ممکن استفاده گردد.
- قبل از باز نمودن ویال واکسن و پیش از شروع واکسیناسیون ویال واکسن بخوبی تکان داده شود. همچنین در صورتی که در زمان واکسیناسیون مدتی ویال واکسن تکان نخورده باشد قبل از شروع واکسیناسیون ویال واکسن به آرامی تکان داده شود.
- قبل از تزریق واکسن جهت کاهش آسیب بافتی و سهولت تزریق دمای محلول واکسن می بایست به حدود ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (دمای اتاق) رسیده باشد.
- از وسایل تزریق استریل جهت واکسیناسیون استفاده گردد.
- کبوتران مسابقه ای و نمایشی جهت ایجاد ایمنی مناسب حداقل ۲۰ روز پیش از مسابقه و یا نمایش واکسینه شوند.

توجه

- تزریق در زمان تخمگذاری و یا غذایی به جوجه ها بلامانع است.
- در صورت تزریق میزان بیشتر واکسن (دو برابر دوز) هیچ واکنش التهابی دیده نشده است.

دوره منع مصرف: ندارد.

عمر قفسه ای: ۲۱ ماه

شرایط نگهداری: واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی: ویال های ۱۰ میلی لیتری (۵۰ دزی) و ویال های ۲۰ میلی لیتری (۱۰۰ دزی)

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: شرکت سرور فجر

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری

پارسیان پخش اکسیر

