



**Products and People
You can rely on!**

BIOCILLIN 150 LA

بایوسیلین ۱۵۰ طولانی اثر
محلول تزریقی آموکسی سیلین ۱۵٪ (طولانی اثر)



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com





BIOCILLIN 150 LA

محلول تزریقی آموکسی سیلین ۱۵٪ (طولانی اثر)

ترکیب دارویی

آموکسی سیلین ۱۵۰ میلی گرم
افزودنی ۱ میلی لیتر

مکانسیم اثر

آموکسی سیلین یک پنی سیلین وسیع الطیف نیمه ساختگی باکتریوسیدال (اثر بر ساخت دیواره سلولی) در برابر گرم مثبت ها و منفی ها می باشد. این آنتی بیوتیک بر علیه کمپیلوباکتر، کلستریدیوم، کورینه باکتریوم، ای کولای، اریزیپلوتریکس، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس های پنسیلیناز منفی و گونه های استرپتوکوکوس اثر دارد و سپس به صورت عمده از ادرار و یا صفرا دفع گردد.

حیوان هدف

گاو، گوسفند و بز

موارد مصرف

عفونت دستگاه گوارش، تنفسی و ادراری ناشی از میکروارگانسیم های حساس به آموکسی سیلین مانند کمپیلوباکتر، کلستریدیوم، کورینه باکتریوم، ای کولای، اریزیپلوتریکس، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس های پنسیلیناز منفی و گونه های استرپتوکوکوس در گاو، گوساله، بز و گوسفند.

روشی مصرف

تزریق داخل عضلانی

میزان مصرف

۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن (در صورت نیاز بعد از ۴۸ ساعت مجدد تکرار شود.)
قبل از مصرف به خوبی تکان داده و بیشتر از ۲۰ میلی لیتر در گاو، ۵ میلی لیتر در گوسفند، بز و گوساله در یک ناحیه تزریق نگردد.

مدت زمان منع مصرف

شیر ۳ روز و گوشت ۲۱ روز

موارد منع مصرف

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به آموکسی سیلین و کم کاری کلیوی دارند نباید مصرف گردد.
همراه تراسایکلین ها، کلرامفنیکل، ماکرولیدها و لینکوزآمیدها مصرف نگردد.

اثرات جانبی

واکنش های ازدیاد حساسیت

شرایط نگهداری

در دمای بین ۲۵ - ۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

ویال های ۱۰۰ و ۵۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: شرکت ایترکمی هلند

شرکت وارد کننده: شرکت سرور فجر

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

