

# HIPRAVIAR®

## BPL2

Inactivated vaccine against Newcastle disease,  
in injectable emulsion

واکسن کشته تزریقی نیوکاسل

HIPRA



### توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۵۴ ۵۲ ۹۳ ۶۶ - ۴۶ ۱۸ ۵۹ ۶۶  
نمابر: ۶۴ ۵۹ ۲۰ ۶۴

[www.parsianpakhsh.com](http://www.parsianpakhsh.com)



# HIPRAVIAR BPL2

## واکسن کشته تزریقی نیوکاسل

### ترکیب

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیرفعال (کشته) شده نیوکاسل، سویه لاسوتا HA16 $\geq$  به همراه ادجوانت روغنی میباشد.

### موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماریهای نیوکاسل در ماکیان و بوقلمون (گوشتی، تخمگذار و مادر)

### موارد منع مصرف

ندارد.

### واکنش های نامطلوب

ندارد.

### مقدار مصرف

• ۰/۵ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده بصورت زیرجلدی در ناحیه پشت گردن، و یا داخل عضله سینه.

### توصیه های زمان واکسیناسیون

- هر گونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.
- واکسن را می توان در دوران تولید با در نظر گرفتن استرس در پرنده در حال تولید استفاده نمود.
- هنگام تزریق واکسن از وسایل استریل تزریق استفاده گردد.
- در زمان تزریق دمای واکسن بهتر است به دمای اتاق ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد رسیده باشد.
- پیش از مصرف بطری واکسن خوب تکان داده شود.
- تنها پرندگان سالم واکسینه شوند.
- در زمان تزریق واکسن بصورت زیرجلدی از تزریق داخل جلدی و یا تزریق داخل مهره های گردنی اجتناب گردد.

### موارد احتیاط در مورد شخص واکسیناتور

تزریق تصادفی ممکن است درد و تورم شدید شود. در این صورت، محل تزریق را به خوبی شست و شو دهید و با پزشک خود سریعاً مشورت کنید.

### دوره منع مصرف

ندارد.

### شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

### بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی).

شرکت سازنده: هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

