

HIPRAVIAR® SHS

Live vaccine, swollen head syndrome and turkey rhinotracheitis

CHICKEN ORIGIN

واکسن زنده سندرم کله بادی طیور و رینوتراکئیت بوقلمون



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAVIAR SHS

واکسن زنده سندرم کله بادی طیور و رینوتراکتیت بوقلمون

ترکیب

این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته رینوتراکتیت ماکیان، سویه ۱۰۶۲، تحت تیپ B، با منشا ماکیان و به میزان حداقل $10^{2.4}$ TCID₅₀ می باشد.

خصوصیات

با منشا ماکیان
تحت تیپ B
تکثیر وسیع، سریع و ماندگار در دستگاه فوقانی تنفس
تحریک ایمنی سلولی و همورال (مخاطی)
ایمنی متقاطع با تحت تیپ A
همولوژی بالا با تحت تیپ‌های اصلی
قابل اجرا توسط روشهای مختلف واکسیناسیون، شامل روش قطره بینی - چشمی، اسپری با قطرات درشت و آب آشامیدنی.

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری سندرم کله بادی (SHS) در گله‌های گوشتی، تخمگذار، مادر و رینوتراکتیت بوقلمون در گله‌های بوقلمون

روش مصرف

قطره چشمی - بینی، آب آشامیدنی و اسپری

روش قطره چشمی - بینی

تزیق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، سپس جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید. چکاندن یک قطره واکسن (هر پرنده ۰/۰۳ میلی لیتر) در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز)

روش آشامیدنی

بعد از آماده سازی واکسن، محلول آماده شده را در میزان مناسبی از آب آشامیدنی مخلوط نموده که آب حاوی واکسن باید در عرض ۱ الی ۲ ساعت توسط طیور مصرف گردد. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد، تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد.

روش اسپری

جهت انجام این روش در ابتدا می بایست دستگاه اسپری (HIPRA WILMA TIMER) را به لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نمایید. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد و تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد. برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی (سنین بالاتر) می توان از اسپری با قطرات ریز طبق توصیه کارخانه سازنده دستگاه اسپری استفاده نمود.
هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظت کننده عینک استفاده نمود.

مقدار مصرف

یک دز برای هر پرنده (گوشتی، تخمگذار و مادر).
هرگونه بر نامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.
در مناطقی که بیماری سندرم کله بادی طیور بومی می باشد، می توان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود.
از تجویز واکسن کمتر از دوازده توصیه شده جدا خودداری شود و هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید، در صورتی که تعداد پرندگان با تعداد دزهای موجود در ویال ها یکسان نباشد، می بایست از دز بالاتر استفاده گردد.

دوره منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

ویالهای ۱۰۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: کیمیا نور کالا

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسین پخش اکسیر

