



**Products and People
You can rely on!**

INTERFLOX 100

اینترفلوکس ۱۰۰

محلول تزریقی حاوی انروفلوکساسین ۱۰٪



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کد پستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com





INTERFLOX 100

محلول تزریقی حاوی انروفلوکساسین ۱۰٪

ترکیب دارویی

انروفلوکساسین ۱۰۰ میلی گرم

مکانسیم اثر

انروفلوکساسین متعلق به خانواده کینولون ها بوده و به عنوان یک باکتریوسیدال مهار به (DNA-Gyrase) صورت اولیه علیه باکتری های گرم منفی مانند کمپیلوباکتر، ای کولای، هموفیلوس، پاستورلا و گونه های سالمونلا عمل می کند.

حیوان هدف

گاو، گوسفند و بز

موارد مصرف

عفونت دستگاه گوارش و تنفسی ناشی از عوامل حساس به انروفلوکساسین مانند ای کولای، پاستورلا مولتاسیدا، منهمیا همولایتیکا، استافیلوکوکوس اورئوس و گونه های مایکوپلاسما در گاو، گوسفند و بز.

روش مصرف

داخل وریدی (آهسته فقط در گاو)، زیر پوستی و داخل عضلانی

میزان مصرف

در صورت تزریقات متعدد در ناحیه های مختلفی از بدن انجام شود و برای مقدار دقیق تزریق بهتر است حیوان وزن گیری شود.
گاو: ۵ میلی گرم به ازای هر ۱ کیلوگرم وزن بدن معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن ۱ بار در روز ۳-۵ روز متوالی
مایکوپلاسمای حاد به همراه آرتریت ناشی از مایکوپلاسمای بویس حساس به انروفلوکساسین در گاوهای کمتر از ۲ سال ۵ میلی گرم به ازای هر ۱ کیلوگرم وزن بدن معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن ۱ بار در روز ۵ روز متوالی
ورم پستان حاد ناشی از ای کولایی: دوز اول ۵ میلی گرم به ازای هر ۱ کیلوگرم وزن معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن به روش داخل وریدی آهسته ۲ روز متوالی، ۱ بار و دوز دوم به صورت زیر پوستی.
بیشتر از ۱۰ میلی لیتر در هر ناحیه تزریق نگردد.
گوسفند و بز: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن ۱ بار در روز برای ۳ روز متوالی به صورت زیر پوستی و بیشتر از ۶ میلی لیتر در هر ناحیه تزریق نگردد.

مدت زمان منع مصرف

تزریقی

گاو: شیر ۳ روز و گوشت ۵ روز

زیرپوستی

گاو: شیر ۴ روز و گوشت ۱۲ روز

گوسفند: شیر ۳ روز و گوشت ۴ روز

بز: شیر ۴ روز و گوشت ۶ روز

مدت زمان منع مصرف

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت به انروفلوکساسین یا دیگر فلورکوئینولون ها و یا به افزودنی ها دارند، نباید مصرف گردد.
در اسب های که در سن رشد هستند (کره اسب) به علت آسیب مخرب احتمالی به غضروف مفصلی استفاده نگردد.

اثرات جانبی

به صورت خیلی نادر احتمال اختلال گوارشی مانند اسهال وجود دارد که خفیف و گذرا می باشد. همچنین به صورت خیلی نادر درمان داخل رگی در گاو می تواند باعث شوک شود که در پی اختلال احتمال در گردش خون می باشد.

شرایط نگهداری

در دمای بین ۲۵ - ۱۵ درجه سانگراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

ویال های ۱۰۰ و ۵۰ میلی لیتری

شرکت سازنده: شرکت اینترکمی هلند

شرکت وارد کننده: شرکت سرور فجر

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

