

GENTAMOX

HIPRA, SPAIN

شرکت
سازنده

جنتامایسین (40 mg) + آموکسی سیلین (150mg)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی، مانع سنتز دیواره سلولی و اثر بر جزء 30S ریبوزوم

طیف و
مکانیسم اثر

گاو، گوساله، گوسفند و بره، بز و بزغاله، اسب و کره اسب

گونه هدف

دوز: ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز به صورت IM

دوز مصرف

گاو: ۳۰ - ۴۰ میلی لیتر در روز

گوساله: ۱۰ - ۱۵ میلی لیتر در روز

اسب بالغ: ۳۰ - ۵۰ میلی لیتر در روز

کره اسب: ۵ - ۱۵ میلی لیتر در روز

گوسفند و بز بالغ: ۵ - ۱۰ میلی لیتر در روز

بره و بزغاله: ۱ - ۵ میلی لیتر در روز

گاو: پنومونی، اسهال، التهاب میکروبی روده، ورم پستان، متریت و آبسه های پوستی

موارد
مصرف

گوسفند و بز: پنومونی، اسهال، التهاب میکروبی روده، پاستورلوز و کلی باسیلوز

اسب: پنومونی، اسهال، التهاب میکروبی روده، عفونت دستگاه ادراری، گورم (Strangles)، آبسه های پوستی و عفونت اندام های حرکتی

گوشت: ۳۰ روز

مدت زمان

شیر: ۲ روز

منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)





PENSTREP-400

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

پروکائین پنیسیلین G (200000IU)
دی هیدرو استرپتومايسين سولفات (200mg)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی، مانع سنتر دیواره سلولی و اثر بر جزء S۳۰ ریبوزوم

طیف و
مکانیسم اثر

گونه هدف

گا: ۱ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن ، ۳ روز
گوساله، گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن ، ۳ روز
به صورت IM

دوز مصرف

علیه باکتری های گرم مثبت: clostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria, staph & strep

علیه باکتری های گرم منفی : Haemophilus, Listeria, Pasteurella, Campylobacter, Klebsiella, Salmonella, E.coli

موارد
مصرف

در درمان عفونت های گوارش، ادراری، تناسلی و تنفسی، اورام پستانی، پوستی، آرتریت و گندیدگی سم کاربرد دارد

گوشت: ۲۱ روز
شیر: ۳ روز

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



INTERTRIM

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

سولفامتوکسازول (200mg) + تریمتوپریم (40 mg)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی، مسیرهای متابولیک

طیف و
مکانیسم اثر

گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

گونه هدف

یک میلی لیتر به ازای ۲۰ - ۱۰ کیلوگرم وزن بدن، دو مرتبه در روز و به مدت ۳-۵ روز تجویز می گردد.
تزریقی به صورت IM و IV Slow

دوز مصرف

علیه باکتری‌های: E. coli, Haemophilus, Salmonella, staph and strep, Pasteurella

موارد
مصرف

در درمان عفونت های دستگاه گوارشی، ادراری، تناسلی و تنفسی کاربرد دارد

گوشت: ۱۲ روز

شیر: ۴ روز

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



INTROCIL PUMP

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

کلیستین سولفات (200000IU)
اسپکتینومایسین (50mg)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی، تأثیر بر غشا سلولی باکتری و تغییر در
نفوذپذیری آن و اثر بر جزء 30S ریبوزوم

طیف و
مکانیسم اثر

گوساله، بره و بزغاله

گونه هدف

۲ بار در روز و یک دز به ازای ۲/۵-۳ کیلوگرم وزن بدن به مدت
۳ روز و هربار فشار پمپ، یک دز معادل یک میلی لیتر دارو را
خارج می‌نماید.

دوز مصرف

علیه باکتری‌های: E.coli, Haemophilus, Salmonella
گوساله، بره و بزغاله: درمان اسهال و عفونت های گوارشی
باکتریایی حساس به آنتی‌بیوتیک‌های فوق

موارد
مصرف

گوشت: ۷روز

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰ + پمپ

بسته
بندی (ml)



Oxilabicyclina Retard

LABIANA, SPAIN

شرکت
سازنده

اکسی تتراسایکلین 200mg (دهیدراته)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی و اثر بر جزء 30S ریبوزوم

طیف و
مکانیسم اثر

گاو، گوسفند، بز

گونه هدف

یک تزریق به میزان ۲۰ میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن) در گاو در گردن و در گوسفند و بز در ران به صورت Deep IM

دوز مصرف

گاو: * عفونت های تنفسی: هیستوفیلوس سامنی، منهیا همولایتیکا، پاستورالا مولتوسیدا و مایکوپلاسما بوویس.
* عفونت های تناسلی: آرکانوباکتریوم پایورنز
* عفونت های سم: دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتالا ملانینوجنیکوس

گوسفند و بز

* عفونت های تنفسی: منهیا همولایتیکا، پاستورال مولتوسیدا
* عفونت های تناسلی: آرکانوباکتریوم پایورنز و کلامیدیا آبورتوس
* عفونت های سم: درماتوفیلوس کونگولنسیس، دیکلوباکتر نودوزوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم و پرووتالا ملانینوجنیکوس

موارد
مصرف

موارد استفاده در سایر عفونت ها

* عفونت های پستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و ای کولای
* سقط انزوتیک ناشی از کلامیدیا آبورتوس، کلامیدیا پسیتاسی
* پلی آرتريت ناشی از گونه های کلامیدیا و مایکوپلاسما.

گوشت گاو ۲۲ روز و گوشت گوسفند و بز ۲۰ روز

مدت زمان منع مصرف

شیر: ۹ روز

۱۰۰

بسته بندی (ml)

در هر محل در گاو بیش از ۱۰ میلی لیتر و در گوسفند و بز بیش از ۳ میلی لیتر تزریق نگردد.



TILOSINA

LABIANA, SPAIN	شرکت سازنده
تایلوزین (تارتارات) (200mg)	ترکیبات
گرم مثبت و منفی (غیر از کلی فرمها) و مایکوپلاسما اثر بر جزء 50S ریبوزوم	طیف و مکانیسم اثر
گاو	گونه هدف
۱۰-۲۰ میلیگرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (برابر با ۰/۵-۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن در روز) به مدت ۵ روز متوالی به صورت Deep IM	دوز مصرف
گاو *عفونت های تنفسی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم *عفونت های سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم در هر محل بیش از ۲۵ میلی لیتر تزریق نگردد.	موارد مصرف
گوشت: ۳۳ روز شیر: ۵ روز	مدت زمان منع مصرف
۱۰۰	بسته بندی (ml)



CEFTISOL

CRIDAPHARM, ROMANIA

شرکت
سازنده

سوسپانسیون تزریقی سف티وفور هیدروکلراید (50mg)

ترکیبات

گرم مثبت و منفی، اختلال در ساخت دیواره سلولی

طیف و
مکانیسم اثر

گاو

گونه هدف

بیماری های تنفسی: ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم (۱ میلی لیتر سفتیسول برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن) به صورت SC یک بار در روز، به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

نکروباسیلوز بین انگشتی حاد: ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم (۱ میلی لیتر سفتیسول برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن) به صورت SC یک بار در روز، به مدت ۳ روز متوالی.

متریت حاد پس از زایمان: در خلال ۱۰ روز پس از زایمان ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (۱ میلی لیتر سفتیسول برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن)، به صورت SC یک بار در روز، به مدت ۵ روز متوالی.

دوز مصرف

بیماری های تنفسی، نکروباسیلوز بین انگشتی حاد، متریت حاد پس از زایمان

موارد
مصرف

مؤثر بر باکتری های : *Haemophilus somni*, *P. multocida* & *haemolytica*, *F. necrophorum*, *Bacteroides Melaninogenicus*

گوشت: ۶ روز

شیر: ۰ روز

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



VITOL-140

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

ویتامین A (80000IU)، ویتامین D3 (40000IU)،
ویتامین E (20mg)

ترکیبات

اثر بر کمبود ویتامینهای بدن

طیف و
مکانیسم اثر

گاو، گوسفند، بز، اسب، گوساله؛ کره اسب؛ سگ و گربه

گونه هدف

گاو و اسب: ۱۰ میلی لیتر
گوساله و کره اسب: ۵ میلی لیتر
گوسفند و بز: ۳ میلی لیتر
سگ: ۱-۵ میلی لیتر
گربه: ۱-۵ میلی لیتر
به صورت IM/SC

دوز مصرف

پیشگیری و درمان: شب کوری، کراتینه شدن قرنینه و کوری،
کاهش رشد، نارسایی دستگاه تناسلی، راشیتیس در دامهای
جوان، نرمی استخوان در دامهای بالغ، ناباروری دامها و کوتاه
شدن دوره نقاهت بیماری. پیشگیری از سقط جنین و جفت
ماندگی در دوره آبستنی و اواخر آن

موارد
مصرف

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



BUTASAL-100

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

بوتافسفان (100mg)، ویتامین B12 (50µg)

ترکیبات

محرك متابوليكي

طيف و
مکانيسم اثر

همه حيوانات

گونه هدف

گاو و اسب: ۵-۲۵ میلی لیتر گوساله و

کره اسب: ۵-۱۲ میلی لیتر

بز و گوسفند: ۵-۲/۵ میلی لیتر

بره و بزغاله: ۵-۲/۵ میلی لیتر

سگ و گربه: ۵-۰/۵ میلی لیتر

طيور: ۱ میلی لیتر

به صورت SC – IM – IV

دوز مصرف

درمان اختلالات متابوليكي حاد و مزمن، نارسايي هاي متابوليكي ناشي از سوء تغذيه اين تركيب به همراه کلسيم و منيزيم در بروز تتاني و فلج عضلاني که در اختلال و بي نظمي در متابوليسم مواد معدني مذکور ايجاد مي شود کاربرد درماني دارد. افزايش قدرت باروري و کاهش اختلالات زايمان و درمان ناباروري، افزايش تخمگذاري، پيشگيري از کانيباليسم

موارد
مصرف

در صورت نياز، هر ۲-۳ روز يکبار قابل تکرار است.

تکرار

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



INTROVIT

INTERCHEMIE, HOLLAND

شرکت
سازنده

مولتی ویتامین + اسید آمینه

ترکیبات

اثر بر کمبود ویتامینهای بدن

طیف و
مکانیسم اثر

گاو، اسب، گوساله، بز و بره، گوسفند، سگ و گربه

گونه هدف

گاو و اسب: ۱۰-۱۵ میلی لیتر
گوساله، بز و گوسفند: ۵-۱۰ میلی لیتر
بره: ۵-۸ میلی لیتر
سگ و گربه: ۰.۵-۲ میلی لیتر
به صورت IM/SC

دوز مصرف

تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان کم اشتها، کم خونی و ضعف، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید، پیشگیری یا درمان استرس ناشی از واکسیناسیون، بیماری ها، حمل و نقل، رطوبت بالا، درجه حرارت بالا و تغییر رژیم غذایی، تسریع در بهبودی و سلامت بدن در دوره نقاهت بیمار یهای عفونی، به همراه مصرف آنتی بیوتیک ها.

موارد
مصرف

بیش از ۱ هفته به صورت متوالی مصرف نگردد.

مدت زمان
منع مصرف

۱۰۰

بسته
بندی (ml)



ESPONJAVET

HIPRA, SPAIN

شرکت
سازنده

مدروکسی پروژسترون استات (60mg)

ترکیبات

این هورمون از رها شدن FSH و LH هیپوفیزی جلوگیری می کند و اوولاسیون را به تاخیر می اندازد

مکانیسم اثر

گونه هدف

* جایگذاری اسفنج با اپلیکاتور
* جهت ضد عفونی اپلیکاتور از الکل، کرزول و فنل نباید استفاده کرد.
* اسفنج باید ۱۲ تا ۱۴ روز داخل واژن باقی بماند سپس آنرا خارج کرده و همزمان ۵۰۰ واحد PMSG به صورت عضلانی تزریق شود.
* بهتر است حداقل بعد از ۷۵ - ۶۰ روز پس از زایمان و در ابتدای دوره جنسی کار گذاشته شود. اگر گوسفند و بز تاکنون زایمان نکرده بایستی حداقل ۷ ماه سن و وزنی معادل ۷۰٪ وزن حیوان بالغ داشته باشد..

نحوه مصرف

همزمانی استروس و ایجاد فحلی:
* اسفنج کاشتنی (ESPONJAVET) اگر به همراه PMSG استفاده شود، باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد.
* هدف استفاده از این اسفنج ایجاد شرایط یکسان از نظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات ماده گله می باشد به طوری که باعث ایجاد فاز لوتئال می شود

موارد
مصرف

مدت زمان
منع مصرف

بسته حاوی ۲۵ عدد اسفنج

بسته
بندی (ml)



GONASER

HIPRA, SPAIN

شرکت
سازنده

گنادوتروپین ۵۰۰۰ واحدی تزریقی (PMSG)

ترکیبات

*عمدتاً مشابه FSH می باشد، اگر چه تا حدودی اثرات مشابه LH هیپوفیزی نیز دارد.
*عملکرد تحریک کنندگی فولیکول و لوتئولیزه کننده
*باعث بروز استروس و اوولاسیون می گردد

مکانیسم اثر

گاو، گوسفند و بز

گونه هدف

* قرص لیوفیلیزه گناسر ۵۰۰۰ واحد را با ۵۰ میلی لیتر حلال مخصوص آن مخلوط کنید، پس از انحلال، هر میلی لیتر از این محلول حاوی ۱۰۰ واحد PMSG خواهد بود.
* **گاو:** جهت درمان آنستروس و ایجاد فحلی ۵۰۰-۱۰۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان و جهت سوپر اوولاسیون ۳۰۰۰-۵۰۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان
* **گوسفند و بز:** جهت همزمانی و ایجاد فحلی ۳۰۰-۶۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان
تزریقی IM Deep

نحوه مصرف

*درمان آنستروس، ایجاد فحلی، ایجاد اوولاسیون، همزمانی استروس، درمان عقیمی ناشی از کم کاری هیپوفیز، چندقلوایی و سوپر اوولاسیون.
* PMSG در گوسفند، بز و گاو جهت خاتمه دادن به دوره آنستروس استفاده می شود

موارد
مصرف

مدت زمان
منع مصرف

ویال های حاوی ۵۰۰۰ واحد و حلال مربوطه

بسته
بندی (ml)

نمودار روش ایجاد استروس در گوسفند و بز



نمودار روش استاندارد سوپر اوولاسیون در گاو





FATROXIMIN (DC)

FATRO, **ITALIA**

شرکت سازنده	ریفاکسیمین (هر سرنگ ۵ میلی لیتری حاوی: ۱۰۰ میلی گرم)
ترکیبات	مهار در سنتز پروتئینهای باکتری
مکانیسم اثر	گاو و گاومیش
گونه هدف	به صورت داخل پستانی * یک سرنگ در هر کارتیه، پس از شیردوشی نهایی و در هنگام خشک کردن * بعد آخرین شیردوشی، تمام شیر باقی مانده پستان را دور بریزید. * سرپستان را با یک ماده ضد عفونی کننده که به این منظور طراحی شده است تمیز و ضد عفونی کنید. * پس از تزریق، پستان را ماساژ دهید تا به خوبی پخش شود.
دوز مصرف	دارای فعالیت ضد باکتریایی بالا در برابر استرپتوکوکوس، استفیلوکوکوس، آرکانوباکتر، ای کولای * موثر بر استف های تولید کنند پنیسلیناز * پماد پستانی فاتروکسیمین در ابتدای دوره خشکی گاوها، گاومیش ها و سایر نشخوارکنندگان بزرگ ماده برای درمان عفونت های تحت بالینی موجود، جلوگیری از عفونت در طول دوره خشکی و جلوگیری از شیوع ورم پستان حاد پس از زایمان استفاده می شود.
موارد مصرف	ورود جزئی: پوشش محافظ را بردارید و تزریق کنید ورود کامل: پوشش محافظ را بردارید، آداپتور ورود جزئی را بردارید و تزریق کنید
مدت زمان منع مصرف	جعبه های حاوی ۶۰ سرنگ
بسته بندی (ml)	



KERASEAL (Teat sealant)

CRIDAPHARM, ROMANIA

شرکت
سازنده

بیسموت ساب نیترات (هر سرنگ ۴ گرمی حاوی: ۶/۲ گرم)

ترکیبات

آنتی اسید و محافظ پستان

مکانیسم اثر

گاو

گونه هدف

به صورت داخل پستانی
* محتویات یک پماد کراسیل را بلافاصله پس از آخرین دوشش دوره شیردهی (در زمان خشک شدن) به هر کارتیۀ تزریق کنید. پس از تزریق سرپستانک یا پستان را ماساژ ندهید.
* باید مراقب بود که حین تزریق عوامل بیماری زا به سرپستانک وارد نشود.
* ضروری است که قبل از تجویز، سرپستانک کامل تمیز و ضد عفونی شود. با پنبه آغشته به الکل (موجود در بسته بندی) یا دستمال مرطوب سرپستانک را تا زمانی که دستمال دیگر کثیفی قابل رویت نداشته باشد پاک کنید
* سپس اجازه دهید تا سرپستان کامل خشک شود
* به صورت آسپتیک تزریق کنید
* در پایان بهتر است سرپستانها را با محلول های ضد عفونی پس از دوشش به روش های غوطه وری یا اسپری تمیز کرد

دوز مصرف

* در گاوهایی که عاری از ورم پستان تحت بالینی هستند، کراسیل می تواند به تنهایی در مدیریت گاو خشک استفاده شود

موارد
مصرف

مدت زمان
منع مصرف

جعبه های حاوی ۲۴ عددی

بسته
بندی (ml)