

HIPRAVIAR® CLON

Live vaccine for Newcastle disease, strain Clone CL/79

واکسن نیوکاسل کلون



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAVIAR CLON

واکسن نیوکاسل کلون

ترکیب

این واکسن حاوی ویروس زنده نیوکاسل کلون سویه CL/79 که هر دز آن حاوی حداقل $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ می باشد.

خصوصیات

سویه مناسب = حفاظت هترولوگ
بالاترین تیتراژ آنتی ژنیک = ایمنی زایی و حفاظت بیشتر
تداخل کمتر با ایمنی مادری = تحریک مناسب ایمنی در یک روزگی
پروسه کلونینگ = حفاظت طولانی، ایمنی زایی بالا و پاتوژنیسیته پایین

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل در گله های گوشتی، تخمگذار و مادر

روش مصرف

چشمی - بینی، آشامیدنی و اسپری

روش قطره چشمی - بینی

تزیق ۱۰ میلی لیتر حلال (آب مقطر) به داخل ویال، سپس جهت حل شدن قرص لیوفیلیزه ویال واکسن را به آرامی تکان دهید. چکاندن یک قطره واکسن (هر پرنده ۰/۰۳ میلی لیتر) در چشم و یا بینی هر پرنده با استفاده از قطره چکان استاندارد (۳۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ دز).

روش آشامیدنی

بعد از آماده سازی واکسن، محلول آماده شده را در میزان مناسبی از آب آشامیدنی مخلوط نموده که آب حاوی واکسن باید در عرض ۱ الی ۲ ساعت توسط طیور مصرف گردد. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد، تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد.

روش اسپری

جهت انجام این روش در ابتدا می بایست دستگاه اسپری را به لحاظ انجام اسپری مناسب و مقدار آب مورد نیاز چک نمود. همیشه ویال واکسن در زیر آب باز گردد. از میزان کمی آب جهت حل نمودن قرص لیوفیلیزه استفاده نموده سپس بعد از حل شدن قرص لیوفیلیزه آن را در داخل آب مورد نیاز جهت مصرف حل نموده. هرگز از آب حاوی اسیدی فایرها استفاده نگردد تنها از آب تمیز، تازه و فاقد کلر و املاح استفاده گردد. برای مرحله اول واکسیناسیون در سنین پایین استفاده از اسپری با قطرات درشت توصیه می گردد. برای مراحل بعدی (سنین بالاتر) می توان از اسپری با قطرات ریز استفاده نمود. هنگام استفاده از واکسن به روش اسپری می بایست از ماسک محافظت کننده عینک استفاده نمود.

مقدار مصرف

یک دز برای هر پرنده (گوشتی، تخمگذار و مادر).
هر گونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی می گردد.
در مناطقی که بیماری نیوکاسل بومی باشد می توان واکسن را در یک روزگی استفاده نمود. از تجویز واکسن کمتر از دوازده (مقدار) توصیه شده جدا خودداری شود و هر پرنده باید یک دز واکسن را حتما دریافت نماید، در صورتی که تعداد پرندگان با تعداد دزهای موجود در ویال ها یکسان نباشد، می بایست از دز بالاتر استفاده گردد.

دوره منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

ویالهای ۲۵۰۰ دزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته).

شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارمیس درمان

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

