

AVISAN MULTI/CO

Inactivated vaccine against egg drop syndrome, Newcastle disease, infectious bronchitis and infectious coryza, in injectable emulsion.

واکسن کشته چهار گانه نیوکاسل،
برونشیت عفونی، سندرم افت تولید تخم مرغ و کوریزای عفونی

HIPRA



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴

www.parsianpakhsh.com



AVISAN MULTI/CO

واکسن کشته چهار گانه نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندروم افت تولید تخم مرغ و کوریزای عفونی

ترکیب

هر دز از این واکسن (۰/۵ میلی لیتر) حاوی	
10^8 EID ₅₀ ≤	ویروس غیرفعال شده نیوکاسل سویه لاسوتا
10^6 EID ₅₀ ≤	ویروس غیرفعال شده برونشیت عفونی سویه H52
307.2HAU ≤	ویروس غیرفعال شده سندروم افت تولید تخم مرغ سویه 127
1.25×10^9 باکتری ≤	باکتری آوی باکتریوم پاراگالیناروم سروتیپ A
1.25×10^9 باکتری ≤	باکتری آوی باکتریوم پاراگالیناروم سروتیپ B
1.25×10^9 باکتری ≤	باکتری آوی باکتریوم پاراگالیناروم سروتیپ C

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماریهای نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندروم افت تولید تخم مرغ و کوریزای عفونی در پोलت ها.

مقدار مصرف

- ۰/۵ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده.
- محل واکسیناسیون زیر جلد در ناحیه پشت گردن و یا داخل عضلانی در عضله سینه می باشد.

توصیه های زمان واکسیناسیون

- واکسیناسیون در طیور بالغ می بایست قبل از شروع تخمگذاری انجام گیرد.
- هرگونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.
- جهت حصول ایمنی مناسب در مواقعی که همه گیری بیماری کوریزای عفونی در منطقه بالا باشد می بایست پرندگان را در دوره پرورش یک بار با واکسن تک کوریزای عفونی (CORIPRAVAC) واکسینه نمود و سپس حداقل ۲ تا ۳ هفته پیش از شروع تولید با واکسن AVISAN MULTI/CO واکسینه نمود. زمان بین دو واکسیناسیون می بایست ۶ هفته باشد.
- هنگام تزریق واکسن از وسایل استریل تزریق استفاده گردد.
- در زمان دمای واکسن بهتر است به دمای اتاق ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد رسیده باشد.
- پس از باز شدن درب بطری واکسن می باست در طول مدت ۱۰ ساعت مصرف گردد.
- پیش از مصرف بطری واکسن خوب تکان داده شود.
- تنها پرندگان سالم واکسینه شوند.
- در تزریق زیرجلدی در گردن از تزریق داخل جلدی و یا تزریق داخل مهره های گردنی اجتناب گردد.

موارد احتیاط در مورد شخص واکسیناتور

تزریق تصادفی ممکن است درد و تورم شدید شود. در این صورت، محل تزریق را به خوبی شست و شو دهید و با پزشک خود سریعاً مشورت کنید.

دوره منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی).

شرکت سازنده: هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

