

AVISAN[®] MULTI

Inactivated vaccine against egg drop syndrome, Newcastle disease and infectious bronchitis, in injectable emulsion.

واکسن کشته سه گانه نیوکاسل
برونشیت عفونی و سندرم افت تولید تخم مرغ

HIPRA



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴

www.parsianpakhsh.com



AVISAN MULTI

واکسن کشته سه گانه نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندرم افت تولید تخم مرغ

ترکیب

هر دز از این واکسن (۰/۵ میلی لیتر) حاوی

HA:2⁴-2⁶

ویروس غیرفعال شده نیوکاسل سویه لاسوتا

HA:2⁶-2⁸

ویروس غیرفعال شده برونشیت عفونی سویه H52

HA:2⁷-2⁹

ویروس غیرفعال شده سندروم افت تولید تخم مرغ سویه 127

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماریهای نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندروم افت تولید تخم مرغ در پالت ها.

مقدار مصرف

• ۰/۵ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده.

• محل واکسیناسیون زیر جلد در ناحیه پشت گردن می باشد.

توصیه های زمان واکسیناسیون

• واکسیناسیون در طیور بالغ می بایست قبل از شروع تخمگذاری انجام گیرد.

• هر گونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.

• هنگام تزریق واکسن از وسایل استریل تزریق استفاده گردد.

• در زمان تزریق دمای واکسن بهتر است به دمای اتاق ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد رسیده باشد.

• پس از باز شدن درب بطری می بایست در طول مدت ۱۰ ساعت مصرف گردد.

• پیش از مصرف بطری واکسن خوب تکان داده شود.

• تنها پرندگان سالم واکسینه شوند.

• واکسن بصورت زیر جلدی تزریق گردد و از تزریق داخل جلدی و یا تزریق داخل مهره های گردنی اجتناب گردد.

موارد احتیاط در مورد شخص واکسیناتور

تزریق تصادفی ممکن است درد و تورم شدید شود. در این صورت، محل تزریق را به خوبی شست و شو دهید و با پزشک خود سریعاً مشورت کنید.

دوره منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی).

شرکت سازنده: هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

