

HIPRAVIAR® BPL2

Inactivated vaccine against Newcastle disease,
in injectable emulsion

واکسن کشته تزریقی نیوکاسل

HIPRA



توزيع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کد پستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۰۲۵۴ ۹۳ ۶۶ - ۰۶ ۱۸ ۴۶
نمبر: ۰۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



HIPRAVIAR BPL2

واکسن کشته تزریقی نیوکاسل

تقریب

هر دز از این واکسن حاوی ویروس غیرفعال (کشته) شده نیوکاسل، سویه لاسوتا HA \geq 16 به همراه ادجوانات روغنی میباشد.

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماریهای نیوکاسل در ماکیان و بوقلمون (گوشتنی، تخمگذار و مادر)

موارد منع مصرف

ندارد.

واکنش های نامطلوب

ندارد.

مقدار مصرف

• ۰/۲ میلی لیتر برای پرنده‌گان کمتر از یک هفته

• ۰/۵ میلی لیتر برای سینین بالاتر

روش مصرف

به صورت زیرجلدی در ناحیه پشت گردن یا داخل عضله سینه

توصیه های زمان واکسیناسیون

• هر گونه برنامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.

• واکسن را می‌توان در دوران تولید با در نظر گرفتن استرس در پرنده در حال تولید استفاده نمود.

• هنگام تزریق واکسن از وسایل استریل تزریق استفاده گردد.

• در زمان تزریق دمای واکسن بهتر است به دمای اتاق ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد رسیده باشد.

• پیش از مصرف بطی واکسن خوب تکان داده شود.

• تنها پرنده‌گان سالم واکسینه شوند.

• در زمان تزریق واکسن بصورت زیرجلدی از تزریق داخل جلدی و یا تزریق داخل مهره‌های گردنی اجتناب گردد.

موارد احتیاط در مورد شخص واکسیناتور

تزریق تصادفی ممکن است درد و تورم شدید شود. در این صورت، محل تزریق را به خوبی شست و شو دهید و با پزشک خود سریعاً مشورت کنید.

دوره منع مصرف

ندارد.

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی).

شرکت سازنده: هیبرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر

