


HESTER

# INACTIVATED IBD, ND, IB, EDS

Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease,  
Avian Infectious Bronchitis & Egg Drop  
Syndrome '76 (Adenovirus) Vaccine, Inactivated

واکسن کشته چهارگانه گامبورو، نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندرم افت تولید تخم مرغ



## توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به  
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱  
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳  
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴  
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴  
www.parsianpakhsh.com



HESTER

# INACTIVATED IBD, ND, IB, EDS

Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease,  
Avian Infectious Bronchitis & Egg Drop  
Syndrome '76 (Adenovirus) Vaccine, Inactivated

واکسن کشته چهارگانه گامبورو، نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندرم افت تولید تخم مرغ

## ترکیب

هر دز از این واکسن (۵/۰ میلی لیتر) حاوی

10 <sup>6.2</sup>	TCID <sub>50</sub>	≤	ویروس غیرفعال شده گامبورو تایپ استاندارد
10 <sup>9</sup>	EID <sub>50</sub>	≤	ویروس غیرفعال شده نیوکاسل سویه لاسوتا
10 <sup>6.9</sup>	EID <sub>50</sub>	≤	ویروس غیرفعال شده برونشیت عفونی سروتیپ ماساچوست
2000	HAU	≤	ویروس غیرفعال شده سندروم افت تولید تخم مرغ سویه های 127

## موارد مصرف

به منظور ایجاد ایمنی، حفاظت از تولید و انتقال آنتی بادی به نتاج درگله های مادر در مقابل بیماریهای نیوکاسل، برونشیت عفونی سندروم افت تولید تخم مرغ، همچنین انتقال آنتی بادی مادری و ایجاد حفاظت در نتاج در روزهای اولیه زندگی در مقابل بیماری گامبورو.

## مقدار مصرف

- ۵/۰ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده
- واکسن بصورت زیرجلدی در قسمت پشتی و پایین گردن تزریق می بایست تزریق گردد.
- واکسیناسیون در طیور بالغ می بایست قبل از شروع تولید انجام گیرد.
- هرگونه بر نامه واکسیناسیون طبق نظر دامپزشک منطقه و بر اساس شرایط گله و منطقه طراحی گردد.
- جهت حصول ایمنی مناسب جهت بیماری نیوکاسل، برونشیت عفونی و گامبورو پرندگان می بایست حداقل ۴ تا ۶ هفته قبل توسط واکسن های زنده این بیماری ها واکسینه شده باشند.

## توصیه های زمان واکسیناسیون

- هنگام تزریق واکسن از وسایل استریل تزریق استفاده گردد.
- در زمان تزریق دمای واکسن بهتر است به دمای اتاق ۲۵ - ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده باشد.
- پس از باز شدن درب بطری واکسن می بایست سریعاً مصرف گردد.
- پیش از مصرف بطری واکسن خوب تکان داده شود.
- تنها پرندگان سالم واکسینه شوند.
- همه پرندگان گله واکسینه شوند.

## موارد احتیاط در مورد شخص واکسیناتور

تزریق تصادفی ممکن است باعث درد و تورم شدید شود. در این صورت، محل تزریق را به خوبی شست و شو دهید و با پزشک خود سرریعا مشورت کنید.

## دوره منبع مصرف

تا ۴۲ روز قبل از کشتار از زدن واکسن اجتناب گردد.

## شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

## بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی)

شرکت سازنده: Hester Bioscience limited

شرکت وارد کننده: سرور فجر

شرکت توزیع کننده: بخش سراسری پارسیان بخش اکسیر

